

Информация Министерства здравоохранения РФ по ситуации, связанной с ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации

1. Эпидемиологическая ситуация*

В Российской Федерации по данным Федерального государственного статистического наблюдения в 2017 году случаи ВИЧ-инфекции были впервые выявлены у **85 802** человек, что составило **58,4** на 100 тыс. населения. Частота новых случаев ВИЧ-инфекции выше среди мужчин и составляет **53 209** человек от общего числа впервые выявленных случаев (2017 г. – **62,0%**; 2016 г. - **61,8 %**). Показатель заболеваемости среди мужчин и женщин и составил **78,2** и **41,4** на 100 тыс. соответственно.

Основное бремя заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на возрастную группу 25-44 года и составляет **75,2%** от общего числа впервые выявленных лиц с ВИЧ – инфекцией.

В специализированных медицинских организациях под диспансерным наблюдением в течение 2017 г. состояли **693120** лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (в 2016 г.- **658 141**), при этом 89,3% пациентов из числа лиц, с впервые установленным диагнозом ВИЧ в 2017 году, встали на учет в этом же году. Охват диспансерным наблюдением лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составил **85,6%** от числа зарегистрированных случаев (в 2016 г. – **70,5 %**).

Распространенность ВИЧ-инфекции на территории страны имеет существенные различия в разных регионах. Основное бремя ВИЧ-инфекции приходится на 22 региона Российской Федерации. Показатель распространенности ВИЧ-инфекцией на конец года составил **430,2** на 100тыс. населения (2016 г. - **416,4**).

Смертность от ВИЧ в 2017 году составила 13,5, впервые отмечено снижение летальности среди пациентов диспансерной группы от причин, связанных со СПИДом - с 34% до 28%.

В 2017 г. от ВИЧ-инфицированных матерей родилось **15 044** детей (2016 г. - **15 989**), из них у **235** (2016 г.- **281**) была подтверждена ВИЧ-инфекция. В **98,4 %** случаев родились здоровые дети, риск вертикальной передачи ВИЧ-инфекции снизился до **1,6%** за счет высокого охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин и новорожденных профилактикой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции: в период родов – **95,0 %**, охват профилактикой новорожденных детей – **99,1 %**.

*Уточнение статистических данных в июне 2018 года (Росстат).

2. Выявление (тестирование) ВИЧ-инфекции

В 2017 году на ВИЧ-инфекцию обследовано **33 870 850** человек, при этом охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения России составил **23%**, что выше значений показателей, чем в 2016 г. (**20,5%**) и 2015 г. (**19,3 %**). В среднем случаи выявления ВИЧ у граждан Российской Федерации составили **3,7** на 1000 обследований.

3. Антиретровирусная терапия

В 2017 году 320 тыс. пациентов получали антиретровирусную терапию (АРВТ), в сравнении с 2016 г. (**259 787**) отмечался значительный прирост охвата АРВТ на **23%**, а с 2011 года он увеличился в 2 раза. Охват АРВТ среди всех ВИЧ-инфицированных, находящихся под диспансерным наблюдением в 2017 году составил **50%** (2016 г. - **39,5%**; 2015г. - **37,3 %**), в том числе охват детей АРВТ - **91%**, и в каждом третьем регионе охват АРВТ составляет свыше 50%. Снижение вирусной нагрузки зарегистрировано у **72%** пациентов, получающих АРВТ.